

AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk




Informatieblad

Week 12 : van 20 tot en met 26 maart 2023

Wil je het verwachte risico op blootstelling aan berkenpollen voor de komende dagen weten?

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) lanceert in samenwerking met Sciensano een **risicovoorspellingsmodel voor berken- en graspollenallergie** op zijn [website](#) en de [KMI-app](#). De voorspellingskaarten en de uitleg van het model zijn ook beschikbaar op de website van [AirAllergy](#):



AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

leefmilieu
brussel
bruxelles
environnement
.brussels


Wallonie


SPW
Service public
de Wallonie

 PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

20/03-26/03/2023	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	0	1	0	0	0
Alnus spp. (Els)	11	28	47	60	33
Betula spp. (Berk)	2	3	0	5	0
Carpinus betulus (Haagbeuk)	189	229	15	198	152
Corylus avellana (Hazelaar)	0	14	4	19	16
Fraxinus excelsior (Es)	112	130	23	147	70
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	0	1	0	0
Larix spp. (Lork)	1	0	0	0	4
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	2	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	0	1	2
Platanus spp. (Plataan)	0	0	0	1	0
Poaceae (Grassen)	0	0	0	3	0
Populus spp. (Populier)	133	212	196	118	65
Quercus spp. (Eik)	2	0	0	1	0
Salix spp. (Wilg)	136	141	56	159	190
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	64	276	29	118	103
Ulmus spp. (Olm)	1	4	6	9	17
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	2	3	0	0	1
Totaal	653	1044	377	839	653

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)



20/03-26/03/2023	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp.	10	30	60	20
Botrytis spp.	30	5	30	10
Cladosporium spp.	400	1425	1360	1225
Epicoccum spp.	0	5	0	15
Stemphylium spp.	0	0	5	0
Totaal	440	2235	1455	1270

Commentaar over de evolutie van het seizoen



De afgelopen week was een overgangperiode tussen het einde van het elzen- en hazelaarseizoen en het begin van het berkenseizoen. Terwijl de pollenconcentraties van els en hazelaar aanzienlijk afnamen, werden in Brussel, Baudour en Genk slechts sporadisch enkele stuifmeelkorrels van de berk waargenomen. De haagbeuk daarentegen is begonnen te bloeien en verspreide grote hoeveelheden stuifmeel in de lucht. Mensen die allergisch zijn voor stuifmeel van de berkenfamilie (waartoe els, hazelaar, haagbeuk en berk behoren) moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen.

Veel andere bomen geven ook stuifmeel af in de lucht, zoals taxus, cipressen, iep, es, wilg en populier.



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel

