



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 20 | 12/05/2025 – 18/05/2025

Wist u dat ?

De drempelwaarde voor het uitlokken van allergische symptomen kan beïnvloed worden door meerdere factoren. Dit hangt af van de gevoeligheid van de patiënt, het allergene karakter van het pollen, de weersomstandigheden, de luchtvervuiling, het verloop van het pollenseizoen enz.

Ondanks al deze vooroordelen wordt er vanuit gegaan dat de meeste personen die allergisch zijn aan grassenpollen symptomen kunnen ervaren vanaf een concentratie van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht.

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

12/05-18/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	1	4	0	0	4
Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)	0	6	0	13	3
Alnus spp. (Els)	1	1	1	0	1
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	1	2	1	4	5
Asteraceae (Andere composieten)	3	2	0	1	4
Betula spp. (Berk)	5	6	3	8	2
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	1	0	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	0	2	0	0	0
Cyperaceae (Cypergrassen)	3	5	0	5	3
Fagus sylvatica (Beuk)	0	1	0	1	1
Fraxinus excelsior (Es)	0	1	0	0	0
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	0	1	0	0
Juglans regia (Notelaar)	5	7	0	3	5
Juncaceae (Russenfamilie)	0	0	0	1	0
Larix spp. (Lork)	1	0	0	0	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	1	5	3	2	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	577	1004	602	2086	2094
Plantago spp. (Weegbree)	4	13	0	29	20
Platanus spp. (Plataan)	1	9	1	18	5
Poaceae (Grassen)	208	198	36	175	348
Populus spp. (Populier)	1	0	0	0	0
Quercus spp. (Eik)	156	152	29	266	261
Rumex spp. (Zuring)	7	39	4	42	37
Salix spp. (Wilg)	0	10	0	2	0
Sambucus spp. (Vlier)	24	22	0	33	14
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	26	162	16	45	13
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	22	14	0	4	3
Totaal	1047	1666	697	2738	2824



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

12/05-18/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	75	15	35	25
Botrytis spp. (Botrytis)	25	35	15	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	5825	3440	645	2455
Epicoccum spp. (Epicoccum)	25	30	5	35
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	5
Totaal	5950	4275	700	2540




De grassen zetten hun bloei voort en de graspollenconcentraties blijven stijgen. In Brussel en Marche-en-Famenne werd de kritische drempelwaarde van 50 korrels/m³ lucht overschreden. In alle andere meetstations bleven de dagelijkse concentraties lager. In de komende weken zullen de concentraties geleidelijk stijgen bij gunstige weersomstandigheden. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.


Zoals gebruikelijk werd aan de kust aanzienlijk minder graspollen gemeten vanwege de weinige vegetatie, in vergelijking met het binnenland.

Daarnaast bloeien er ook andere kruidachtige planten, met name weegbree, zuring en brandnetels. Terwijl weegbree en zuring licht allergieverwekkend zijn en dus voorzorgsmaatregelen vereisen voor gevoelige mensen, heeft de brandnetelfamilie een minimale impact op allergieën bij de bevolking.


Chêne-Eik-Oak (*Quercus*)




Platane-Plataan-Plane (*Platanus*)



Pinacées-Dennenfamilie (*Pinaceae*)




Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)






Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)





Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)

