



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 24 | 09/06/2025 – 15/06/2025

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



Grassen



***Cladosporium* spp.**

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

09/06-15/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	2	4	0	5	1
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	1	0	1	1
Asteraceae (Andere composieten)	1	1	0	0	0
Betula spp. (Berk)	0	0	0	2	1
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	0	1	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	41	73	0	125	29
Corylus avellana (Hazelaar)	0	0	0	5	0
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirea)	0	0	0	0	4
Juncaceae (Russenfamilie)	0	2	1	3	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	2	0	1	1	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	23	18	8	46	37
Plantago spp. (Weegbree)	5	2	4	19	19
Platanus spp. (Plataan)	1	1	0	2	0
Poaceae (Grassen)	355	517	215	638	1016
Quercus spp. (Eik)	2	1	0	5	2
Rumex spp. (Zuring)	7	12	1	24	13
Sambucus spp. (Vlier)	12	6	0	18	16
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	24	33	10	8	10
Tilia spp. (Linde)	2	13	0	24	8
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	575	468	57	459	659
Totaal	1052	1152	298	1385	1817

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

02/06-08/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	1	0	0	0	0
Asteraceae (Andere composieten)	0	0	0	2	8
Betula spp. (Berk)	3	1	2	2	2
Castanea sativa (Tamme kastanje)	2	1	0	4	1
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirea)	0	0	0	0	2
Juglans regia (Notelaar)	0	1	0	0	0
Juncaceae (Russenfamilie)	0	1	0	1	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	1	1	0	3	2
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	15	13	30	27	40
Plantago spp. (Weegbree)	7	5	0	6	15
Platanus spp. (Plataan)	0	3	0	0	0
Poaceae (Grassen)	297	380	118	389	754
Quercus spp. (Eik)	1	5	0	12	4
Rumex spp. (Zuring)	3	1	1	7	6
Sambucus spp. (Vlier)	23	32	0	34	12
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	10	21	2	7	2
Tilia spp. (Linde)	3	20	0	5	7
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	173	177	55	126	172
Totaal	539	662	208	625	1028

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

09/06-15/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	480	385	325	210
Botrytis spp. (Botrytis)	130	35	195	150
Cladosporium spp. (Cladosporium)	51240	39045	34650	31940
Epicoccum spp. (Epicoccum)	105	335	165	175
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	5	25	5
Totaal	51955	42535	35360	32480




Het graspollenseizoen is volop bezig, met hoge concentraties. De gunstige weersomstandigheden zijn bevorderlijk voor deze pollen. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Ook pollen van andere kruidachtige planten, zoals weegbree, zuring en brandnetels, zijn momenteel aanwezig in de lucht. Terwijl weegbree en zuring licht allergieverwekkend zijn en dus voorzorgsmaatregelen vereisen voor gevoelige mensen, heeft de brandnetelfamilie een minimale impact op allergieën bij de bevolking.


Zoals gebruikelijk werd aan de kust aanzienlijk minder graspollen gemeten vanwege de weinige vegetatie, in vergelijking met het binnenland.

Daarnaast zijn de concentraties aan de schimmelsporen van het genus *Cladosporium* gestegen. In alle meetstations werd vorige week de drempelwaarde van 3000 sporen/m³ lucht overschreden. Mensen die allergisch zijn voor deze schimmelsporen moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Pinacées-Dennenfamilie (*Pinaceae*)




Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)







Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)





Cladosporium



Alternaria

