



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 27 | 30/06/2025 – 06/07/2025

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



Graminées



***Cladosporium* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

30/06-06/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Erable)	0	0	0	0	1
Alnus spp. (Aulne)	0	0	1	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	6	10	7	2	2
Apiaceae (Ombellifères)	1	0	1	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	0	1	0	0	5
Asteraceae (Autres astéracées)	2	2	2	0	1
Betula spp. (Bouleau)	0	0	5	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	91	92	74	77	57
Ericaceae (Ericacées)	1	0	0	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	0	7	2	0	0
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	1	0	0	0
Ligustrum vulgare (Troène)	0	0	0	0	2
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	4	9	6	1	13
Plantago spp. (Plantain)	4	4	7	2	7
Poaceae (Graminées)	101	108	165	140	272
Quercus spp. (Chêne)	1	0	2	0	0
Rumex spp. (Oseille)	1	1	9	0	5
Sambucus spp. (Sureau)	2	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	23	46	8	3	1
Tilia spp. (Tilleul)	0	7	5	0	9
Urticaceae (Urticacées)	112	82	94	48	175
Total	349	371	388	273	550



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

30/06-06/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	710	1475	1135
Botrytis spp. (Botrytis)	80	95	110
Cladosporium spp. (Cladosporium)	35025	51345	43630
Epicoccum spp. (Epicoccum)	75	330	475
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	5
Total	35900	55160	45355


23/06-29/06/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	115	445	380	345
Botrytis spp. (Botrytis)	30	130	130	95
Cladosporium spp. (Cladosporium)	10790	36170	28870	15985
Epicoccum spp. (Epicoccum)	20	65	280	35
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	30
Total	10955	38425	29660	16490




La saison des pollens de graminées est toujours en cours, mais les concentrations sont en train de diminuer. Les concentrations quotidiennes ne dépassent plus le seuil critique. Les conditions météorologiques favorables stimulent la dispersion de ces pollens. Les personnes allergiques aux pollens de graminées doivent continuer à prendre toutes les précautions nécessaires.

Par ailleurs, les concentrations en spores fongiques du genre *Cladosporium* sont élevées. Les personnes allergiques à cette moisissure doivent prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.

Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

