



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 29-31 | 14/07/2025 – 03/08/2025

Les spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

27/07-03/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	4	19	7	8	7
Apiaceae (Ombellifères)	0	0	0	1	1
Artemisia spp. (Armoise)	27	19	10	10	20
Asteraceae (Autres astéracées)	0	0	4	5	5
Castanea sativa (Châtaignier)	6	0	6	0	0
Ericaceae (Ericacées)	0	0	0	1	0
Filipendula spp. (Spirée)	13	2	3	0	4
Humulus lupulus (Houblon)	1	2	0	0	5
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	3	1	0
Plantago spp. (Plantain)	2	4	15	0	4
Poaceae (Graminées)	8	16	19	12	15
Quercus spp. (Chêne)	0	0	0	2	0
Rumex spp. (Oseille)	1	0	2	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	10	9	8	7	15
Tilia spp. (Tilleul)	1	2	1	1	0
Urticaceae (Urticacées)	622	426	380	89	488
Total	695	500	458	137	564



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

21/07-27/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	21	12	10	2	10
Apiaceae (Ombellifères)	0	0	0	0	2
Artemisia spp. (Armoise)	23	4	7	4	7
Asteraceae (Autres astéracées)	1	0	1	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	7	0	0	2	0
Filipendula spp. (Spirée)	6	7	3	5	7
Humulus lupulus (Houblon)	0	0	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	3	5	1	1
Plantago spp. (Plantain)	10	2	10	1	6
Poaceae (Graminées)	14	15	23	9	22
Quercus spp. (Chêne)	0	0	1	0	0
Rumex spp. (Oseille)	1	1	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	13	28	3	4	4
Urticaceae (Urticacées)	556	295	256	46	384
Total	652	367	320	74	444



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

14/07-20/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	0	1	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	15	16	15	12	6
Apiaceae (Ombellifères)	3	0	0	0	1
Artemisia spp. (Armoise)	11	0	1	4	3
Asteraceae (Autres astéracées)	0	1	0	4	2
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	2	0
Castanea sativa (Châtaignier)	6	6	3	7	4
Filipendula spp. (Spirée)	10	9	0	12	14
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	4	9	2	3
Plantago spp. (Plantain)	19	6	12	10	14
Poaceae (Graminées)	25	32	32	35	39
Quercus spp. (Chêne)	1	0	0	0	0
Rumex spp. (Oseille)	1	3	0	0	0
Sambucus spp. (Sureau)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	14	23	5	11	5
Tilia spp. (Tilleul)	0	3	1	0	2
Urticaceae (Urticacées)	312	186	121	129	150
Total	419	290	199	229	243



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

28/07-03/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	2080	1485	1070	3330
Botrytis spp. (Botrytis)	390	175	355	125
Cladosporium spp. (Cladosporium)	44800	29130	33175	31530
Epicoccum spp. (Epicoccum)	455	340	570	160
Stemphylium spp. (Stemphylium)	40	30	35	35
Total	47765	37650	35205	35180

21/07-27/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	1360	950	1095	830
Botrytis spp. (Botrytis)	215	100	165	65
Cladosporium spp. (Cladosporium)	61025	42445	53110	26470
Epicoccum spp. (Epicoccum)	515	320	790	165
Stemphylium spp. (Stemphylium)	15	40	20	55
Total	63130	47280	55180	27585

14/07-20/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	2250	2430	1535	2300
Botrytis spp. (Botrytis)	55	160	130	100
Cladosporium spp. (Cladosporium)	62705	54965	49630	41050
Epicoccum spp. (Epicoccum)	520	660	960	270
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	30	35	60
Total	65540	61655	52290	43780




La saison des pollens de graminées est désormais officiellement terminée. Bien que des pollens puissent encore être présents dans l'air, principalement en raison du vent, la période active est révolue. Les concentrations sont actuellement largement inférieures au seuil allergique de 50 pollens/m³. Pour les personnes allergiques aux pollens de graminées, cela signifie généralement un soulagement durable de leurs symptômes.


En même temps, la saison des pollens d'armoise (*Artemisia*) a commencé. Ces pollens sont également allergènes et peuvent provoquer des symptômes chez les personnes sensibles. Il est donc conseillé de rester vigilant, en particulier si vous avez déjà réagi aux pollens d'armoise.

Enfin, la chaleur estivale favorise des concentrations élevées de spores de moisissures dans l'air, en particulier des genres *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces spores sont parmi les allergènes extérieurs les plus fréquents en été et peuvent causer des troubles respiratoires chez les personnes sensibles aux moisissures. Les personnes allergiques à ces spores doivent donc continuer à prendre toutes les précautions nécessaires.


Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)






Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

