



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaines 34-35 | 18/08/2025 – 31/08/2025

Les spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

25/08-31/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	29	17	11	11	13
Ambrosia spp. (Ambroisie)	2	1	2	1	2
Apiaceae (Ombellifères)	1	0	2	0	5
Artemisia spp. (Armoise)	16	1	11	14	3
Asteraceae (Autres astéracées)	2	3	0	3	1
Castanea sativa (Châtaignier)	0	0	7	2	1
Ericaceae (Ericacées)	0	0	2	1	0
Filipendula spp. (Spirée)	10	12	0	0	5
Humulus lupulus (Houblon)	3	10	1	0	2
Ligustrum vulgare (Troène)	0	0	0	2	0
Plantago spp. (Plantain)	1	2	14	15	11
Poaceae (Graminées)	24	13	9	21	6
Rumex spp. (Oseille)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	2	7	3	6	0
Tilia spp. (Tilleul)	1	1	1	2	2
Urticaceae (Urticacées)	594	528	383	339	583
Total	685	596	446	417	634



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

18/08-24/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	20	9	18	3	5
Ambrosia spp. (Ambroisie)	1	3	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	18	13	12	1	11
Asteraceae (Autres astéracées)	2	2	1	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	5	0	2	0	0
Ericaceae (Ericacées)	2	0	3	0	1
Filipendula spp. (Spirée)	13	1	1	0	0
Humulus lupulus (Houblon)	32	53	28	7	29
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	2	1	1
Plantago spp. (Plantain)	12	8	16	2	17
Platanus spp. (Platane)	0	1	0	0	0
Poaceae (Graminées)	15	24	34	4	25
Rumex spp. (Oseille)	1	5	1	1	0
Salix spp. (Saule)	0	1	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	4	12	3	2	2
Tilia spp. (Tilleul)	0	0	1	0	0
Urticaceae (Urticacées)	1133	802	584	181	1023
Total	1258	934	707	202	1115



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

25/08-31/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	430	300	450	215
Botrytis spp. (Botrytis)	80	20	35	55
Cladosporium spp. (Cladosporium)	19700	16175	19235	9605
Epicoccum spp. (Epicoccum)	185	310	320	45
Stemphylium spp. (Stemphylium)	25	25	15	45
Total	20420	19990	20055	9965


18/08-24/08/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	350	425	470	325
Botrytis spp. (Botrytis)	150	110	115	35
Cladosporium spp. (Cladosporium)	9500	8705	8310	2350
Epicoccum spp. (Epicoccum)	215	245	290	85
Stemphylium spp. (Stemphylium)	35	35	65	5
Total	10250	11860	9250	2800




Les saisons polliniques des graminées et de l'armoise (*Artemisia*) sont désormais terminées. Quelques grains peuvent encore être détectés de manière irrégulière, principalement en raison de resuspensions par le vent, mais leur période d'émission est close.

Les conditions météorologiques estivales sont également favorables au développement de certaines moisissures allergisantes. Les concentrations en spores des genres *Cladosporium* sont toujours très élevées. Ces spores sont les allergènes extérieurs les plus courants en été et peuvent provoquer des symptômes respiratoires chez les personnes sensibilisées.


Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

