



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 36 | 01/09/2025 – 07/09/2025

Les spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



***Cladosporium* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

01/09-07/09/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	22	3	7	7	2
Ambrosia spp. (Ambroisie)	4	2	4	2	3
Artemisia spp. (Armoise)	9	1	2	2	12
Asteraceae (Autres astéracées)	0	0	0	1	0
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	1	0
Castanea sativa (Châtaignier)	0	2	3	3	0
Ericaceae (Ericacées)	0	0	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	7	5	1	9	0
Humulus lupulus (Houblon)	0	1	0	0	0
Ligustrum vulgare (Troène)	0	0	0	2	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	4	1	2
Plantago spp. (Plantain)	6	2	14	11	2
Poaceae (Graminées)	39	20	9	49	15
Rumex spp. (Oseille)	0	0	1	1	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	2	3	0	1	0
Tilia spp. (Tilleul)	0	1	0	0	0
Urticaceae (Urticacées)	186	129	92	105	136
Total	275	170	138	195	172



Spores fongiques



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)


01/09-07/09/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	540	435	415	1030
Botrytis spp. (Botrytis)	225	190	310	360
Cladosporium spp. (Cladosporium)	58750	50455	58675	46305
Epicoccum spp. (Epicoccum)	480	385	510	345
Stemphylium spp. (Stemphylium)	15	30	45	95
Total	60010	55735	59955	48135




Les saisons polliniques des graminées et de l'armoise (*Artemisia*) sont désormais terminées. Quelques grains peuvent encore être détectés de manière irrégulière, principalement en raison de resuspensions par le vent, mais leur période d'émission est close.

Les conditions météorologiques estivales sont également favorables au développement de certaines moisissures allergisantes. Les concentrations en spores du genre *Cladosporium* sont toujours très élevées. Ces spores sont les allergènes extérieurs les plus courants en été et peuvent provoquer des symptômes respiratoires chez les personnes sensibilisées.


Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

