




# AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 36 | 01/09/2025 – 07/09/2025

**Allergieverwekkende schimmelsporen momenteel in de lucht:**



***Cladosporium* spp.**

# Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)

| 01/09-07/09/2025                                        | Baudour | Brussel | De Haan | Genk | Marche-en-Famenne |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------------------|
| Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)                       | 22      | 3       | 7       | 7    | 2                 |
| Ambrosia spp. (Ambrosia)                                | 4       | 2       | 2       | 4    | 3                 |
| Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)                        | 9       | 1       | 2       | 2    | 12                |
| Asteraceae (Andere composieten)                         | 0       | 0       | 1       | 0    | 0                 |
| Betula spp. (Berk)                                      | 0       | 0       | 1       | 0    | 0                 |
| Castanea sativa (Tamme kastanje)                        | 0       | 2       | 3       | 3    | 0                 |
| Ericaceae (Heidefamilie)                                | 0       | 0       | 0       | 1    | 0                 |
| Filipendula spp. (Spirea)                               | 7       | 5       | 9       | 1    | 0                 |
| Humulus lupulus (Hop)                                   | 0       | 1       | 0       | 0    | 0                 |
| Ligustrum vulgare (Liguster)                            | 0       | 0       | 2       | 0    | 0                 |
| Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)                       | 0       | 1       | 1       | 4    | 2                 |
| Plantago spp. (Weegbree)                                | 6       | 2       | 11      | 14   | 2                 |
| Poaceae (Grassen)                                       | 39      | 20      | 49      | 9    | 15                |
| Rumex spp. (Zuring)                                     | 0       | 0       | 1       | 1    | 0                 |
| Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie) | 2       | 3       | 1       | 0    | 0                 |
| Tilia spp. (Linde)                                      | 0       | 1       | 0       | 0    | 0                 |
| Urticaceae (Brandnetelfamilie)                          | 186     | 129     | 105     | 92   | 136               |
| Totaal                                                  | 275     | 170     | 195     | 138  | 172               |



# Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)


| 01/09-07/09/2025                        | Baudour      | Brussel      | De Haan      | Genk         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alternaria spp. (Alternaria)            | 540          | 435          | 1030         | 415          |
| Botrytis spp. (Botrytis)                | 225          | 190          | 360          | 310          |
| <b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b> | <b>58750</b> | <b>50455</b> | <b>46305</b> | <b>58675</b> |
| Epicoccum spp. (Epicoccum)              | 480          | 385          | 345          | 510          |
| Stemphylium spp. (Stemphylium)          | 15           | 30           | 95           | 45           |
| <b>Totaal</b>                           | <b>60010</b> | <b>55735</b> | <b>48135</b> | <b>59955</b> |




De pollenseizoenen van grassen en bijvoet (*Artemisia*) zijn nu voorbij. Er kunnen nog af en toe enkele pollen in de lucht worden waargenomen, voornamelijk door resuspensie door de wind, maar de actieve afgifteperiode is voorbij.

Daarnaast bevordert het zomerse weer de ontwikkeling van bepaalde allergene schimmels. De concentraties van sporen van het geslacht *Cladosporium* zijn nog zeer hoog. Deze schimmelsporen behoren tot de meest voorkomende buitenallergenen in de zomer en kunnen ademhalingsklachten veroorzaken bij gevoelige personen.

Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)




Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

