



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 1-10 | 01/01/2026 – 08/03/2026

Le saviez-vous?

Vous pouvez suivre l'évolution de la saison pollinique via le site web www.airallergy.be, l'app AirAllergy ([Android](#)/[iOS](#)), [BlueSky](#), et aussi en vous abonnant à la newsletter hebdomadaire.

Cette newsletter offre une rétrospective des semaines écoulées, complémentaire aux informations affichées au fil des mises à jour sur le site web. Elle contient les résultats hebdomadaires des concentrations de pollen aux différentes stations de récolte, ainsi qu'un commentaire résumant la situation.



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

05/01-11/01/2026	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	3	3	10	0
Corylus avellana (Noisetier)	2	3	1	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	1	0	0	1
Total	7	6	11	2

12/01-18/01/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1	21	7	57	6
Carpinus betulus (Charme)	0	1	0	0	0
Corylus avellana (Noisetier)	1	117	10	16	72
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	0	182	3	5	32
Urticaceae (Urticacées)	0	0	0	0	1
Total	3	321	20	78	111

19/01-25/01/2026	Baudour	Bruxelles	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	26	109	56	20
Corylus avellana (Noisetier)	321	244	91	75
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	4	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	7	40	0	18
Total	354	394	151	113



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

26/01-01/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	101	44	49	10	20
Corylus avellana (Noisetier)	233	147	145	26	83
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	2	6	5	0	11
Urticaceae (Urticacées)	0	1	0	0	0
Total	336	198	199	37	115

02/02-08/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1179	558	394	330	159
Corylus avellana (Noisetier)	609	509	448	177	682
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	0	0	1
Populus spp. (Peuplier)	2	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	39	24	26	26	57
Total	1829	1092	868	533	899



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

09/02-15/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1749	1561	3704	308	666
Corylus avellana (Noisetier)	179	244	819	36	340
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	1	2	1	2
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	1	0	1
Populus spp. (Peuplier)	1	0	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	81	226	78	26	73
Ulmus spp. (Orme)	0	2	0	0	1
Total	2010	2034	4604	371	1083

16/02-22/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	764	468	2814	178	322
Corylus avellana (Noisetier)	61	41	46	11	104
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	0	0	0
Populus spp. (Peuplier)	12	1	3	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	118	347	125	16	33
Ulmus spp. (Orme)	0	1	1	0	0
Total	955	860	2989	205	459



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

23/02-01/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1100	2122	11270	850	2419
Carpinus betulus (Charme)	17	9	3	0	5
Corylus avellana (Noisetier)	86	150	159	13	248
Fraxinus excelsior (Frêne)	133	91	33	21	36
Larix spp. (Mélèze)	0	0	2	0	1
Ligustrum vulgare (Troène)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	0	3	2
Poaceae (Graminées)	3	0	0	0	1
Populus spp. (Peuplier)	153	66	85	124	43
Salix spp. (Saule)	37	40	21	7	8
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	449	4833	1228	188	1576
Ulmus spp. (Orme)	12	61	36	4	57
Urticaceae (Urticacées)	0	0	1	0	0
Total	1990	7374	12838	1210	4396



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

02/03-08/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	427	433	949	358	695
Betula spp. (Bouleau)	6	4	7	0	4
Carpinus betulus (Charme)	144	82	70	8	124
Corylus avellana (Noisetier)	25	46	62	14	54
Fraxinus excelsior (Frêne)	1016	877	362	171	470
Juglans regia (Noyer)	5	0	2	0	0
Larix spp. (Mélèze)	0	15	8	0	21
Ligustrum vulgare (Troène)	0	2	9	0	0
Poaceae (Graminées)	0	2	0	0	0
Populus spp. (Peuplier)	353	490	117	215	110
Salix spp. (Saule)	285	289	206	42	220
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	377	840	638	97	508
Ulmus spp. (Orme)	25	56	97	17	61
Urticaceae (Urticacées)	0	1	0	0	0
Total	2663	3137	2527	922	2267



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

05/01-11/01/2026	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	15	5	30
Cladosporium spp. (Cladosporium)	465	415	190
Total	545	420	220

12/01-18/01/2026	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	25	0	60
Botrytis spp. (Botrytis)	10	0	25
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2165	360	2295
Epicoccum spp. (Epicoccum)	10	0	5
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	5
Total	2420	360	2390

19/01-25/01/2026	Baudour	Bruxelles	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	40	15	50
Botrytis spp. (Botrytis)	20	15	25
Cladosporium spp. (Cladosporium)	880	1490	3200
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	5
Total	940	1670	3280



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

26/01-01/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	35	0	10	70
Botrytis spp. (Botrytis)	25	20	10	15
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1750	1300	1210	2400
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	15	0
Total	1815	1425	1245	2485

02/02-08/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	45	20	10	0
Botrytis spp. (Botrytis)	35	15	30	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2660	2280	1915	3535
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	15	25
Total	2740	2680	1970	3580

09/02-15/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	40	40	5	60
Botrytis spp. (Botrytis)	55	25	35	25
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2115	1235	1980	1480
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	5	15	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	10
Total	2215	1660	2035	1575



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

16/02-22/02/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	40	10	15	30
Botrytis spp. (Botrytis)	30	15	20	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2150	1025	940	300
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	10	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	5	0
Total	2220	1320	990	330

23/02-01/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	55	30	15	100
Botrytis spp. (Botrytis)	65	15	70	10
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2360	1825	1910	1355
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	10	15	25
Total	2485	3050	2010	1490

02/03-08/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	50	60	15	95
Botrytis spp. (Botrytis)	20	65	150	15
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1860	1440	2065	700
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	15	0
Total	1930	2825	2245	810




En 2026, la saison pollinique du noisetier a commencé à la période habituelle, le 15 janvier. Le temps sec en début d'année a favorisé la dispersion des pollens. Cela a également favorisé un début de saison plus précoce pour le pollen d'aulne, soit le 18 janvier.


Les deux saisons polliniques arrivent à leur fin, la saison du noisetier s'étant déroulée avec une intensité moyenne, sans pics particuliers. La saison de l'aulne a en revanche présenté 2 pics nets : un premier le 13 février, suivi d'un second vers le 25 février.

Par ailleurs, d'autres arbres tels que les cyprès, les frênes, les saules et les peupliers ont également entamé leur période de floraison.


Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)




If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae



Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)

