



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 11 | 09/03/2026 – 15/03/2026

Le saviez-vous?

La production pollinique annuelle des arbres dépend d'un cycle biologique propre à chaque espèce et des conditions météorologiques qui surviennent durant le développement des inflorescences. Cette production peut considérablement varier d'une année à l'autre.

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

09/03-15/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Erable)	0	4	0	0	0
Alnus spp. (Aulne)	58	102	415	77	111
Asteraceae (Autres astéracées)	0	3	0	0	0
Betula spp. (Bouleau)	352	402	133	25	37
Carpinus betulus (Charme)	703	788	464	32	516
Corylus avellana (Noisetier)	7	16	14	0	14
Fagus sylvatica (Hêtre)	0	0	0	3	0
Fraxinus excelsior (Frêne)	1210	1798	1739	296	1098
Hippophae rhamnoides (Argousier)	1	0	0	2	0
Juglans regia (Noyer)	7	0	0	0	0
Juncaceae (Juncacées)	0	0	1	0	0
Larix spp. (Mélèze)	0	0	0	1	7
Ligustrum vulgare (Troène)	4	0	11	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	0	1	0
Platanus spp. (Platane)	10	19	0	0	1
Poaceae (Graminées)	0	0	0	1	0
Populus spp. (Peuplier)	407	345	810	220	42
Quercus spp. (Chêne)	0	0	0	3	0
Salix spp. (Saule)	225	344	291	31	124
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	203	316	165	29	102
Ulmus spp. (Orme)	14	18	16	13	4
Urticaceae (Urticacées)	1	0	0	0	0
Total	3202	4155	4059	734	2056



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

09/03-15/03/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	20	25	15	125
Botrytis spp. (Botrytis)	40	20	60	10
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1315	1620	1085	890
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	10	15
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	0	0
Total	1385	3185	1170	1040




La saison pollinique du noisetier s'est terminée la semaine passée. Les concentrations dans l'air sont devenues très faibles.


En outre, la saison des pollens du bouleau a commencé le 9 mars. En raison des douces températures, cette saison a démarré plus tôt que d'habitude. Les personnes sensibles aux pollens de la famille des bétulacées doivent prendre toutes les mesures de précaution.

En outre, d'autres arbres comme les cyprès, les frênes, les saules et les peupliers ont également entamé leur période de floraison.


Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)




If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae




Bouleau-Berk-Birch (*Betula*)



Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)

