



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 11 | 09/03/2026 – 15/03/2026

Wist u dat?

De jaarlijkse stuifmeelproductie van bomen hangt af van een biologische cyclus die specifiek is voor elke soort en van de weersomstandigheden tijdens de ontwikkeling van de bloeiwijze. Deze productie kan van jaar tot jaar aanzienlijk verschillen.

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

09/03-15/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	0	4	0	0	0
Alnus spp. (Els)	58	102	77	415	111
Asteraceae (Andere composieten)	0	3	0	0	0
Betula spp. (Berk)	352	402	25	133	37
Carpinus betulus (Haagbeuk)	703	788	32	464	516
Corylus avellana (Hazelaar)	7	16	0	14	14
Fagus sylvatica (Beuk)	0	0	3	0	0
Fraxinus excelsior (Es)	1210	1798	296	1739	1098
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	1	0	2	0	0
Juglans regia (Notelaar)	7	0	0	0	0
Juncaceae (Russenfamilie)	0	0	0	1	0
Larix spp. (Lork)	0	0	1	0	7
Ligustrum vulgare (Liguster)	4	0	0	11	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	1	0	0
Platanus spp. (Plataan)	10	19	0	0	1
Poaceae (Grassen)	0	0	1	0	0
Populus spp. (Populier)	407	345	220	810	42
Quercus spp. (Eik)	0	0	3	0	0
Salix spp. (Wilg)	225	344	31	291	124
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	203	316	29	165	102
Ulmus spp. (Olm)	14	18	13	16	4
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	1	0	0	0	0
Totaal	3202	4155	734	4059	2056

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

09/03-15/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	20	25	125	15
Botrytis spp. (Botrytis)	40	20	10	60
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1315	1620	890	1085
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	15	10
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	0	0
Totaal	1385	3185	1040	1170




Het pollenseizoen van de hazelaar is de voorbije week afgelopen. De concentraties in de lucht zijn inmiddels zeer laag.


Daarnaast is het berkenpollenseizoen gestart op 9 maart. Door de zachte temperaturen is dit seizoen vroeger begonnen dan gebruikelijk. Mensen die gevoelig zijn voor pollen van de berkenfamilie moeten voorzorgsmaatregelen nemen.

Daarnaast hebben ook andere bomen zoals cipressen, essen, wilgen en populieren hun bloeiperiode gestart.


Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)




If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae




Bouleau-Berk-Birch (*Betula*)



Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)

