



# AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 14 | 30/03/2026 – 05/04/2026

## Wist u dat?

Er bestaat een kruisallergie tussen berkenstuifmeel en bepaalde vruchten zoals appels, hazelnoten, kiwi's. Het rauw eten van deze vruchten kan bij sommige mensen die gevoelig zijn voor berkenstuifmeel leiden tot voedselallergieën.

Door de huidige staking bij Bpost, die het vervoer van stalen verstoort, zijn sommige resultaten nog niet beschikbaar. Ze worden gepubliceerd zodra de stalen zijn ontvangen en geanalyseerd.



# Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)

30/03-05/04/2026	Baudour	Brussel	De Haan
Acer spp. (Esdoorn)	0	0	0
Alnus spp. (Els)	3	2	13
<b>Betula spp. (Berk)</b>	<b>2590</b>	<b>3292</b>	<b>448</b>
Carpinus betulus (Haagbeuk)	7	11	2
Corylus avellana (Hazelaar)	0	1	0
Cyperaceae (Cypergrassen)	0	0	0
Ericaceae (Heidefamilie)	0	1	0
Fagus sylvatica (Beuk)	2	16	1
Fraxinus excelsior (Es)	17	21	34
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	2	1	113
Larix spp. (Lork)	0	1	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	21	7	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	3
Platanus spp. (Plataan)	33	343	2
Poaceae (Grassen)	3	2	1
Populus spp. (Populier)	16	36	1
Quercus spp. (Eik)	25	33	11
Salix spp. (Wilg)	63	53	4
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cypresenfamilie)	102	333	36
Ulmus spp. (Olm)	1	2	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	1	1	0
<b>Totaal</b>	<b>2886</b>	<b>4156</b>	<b>669</b>

# Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)


30/03-05/04/2026	Baudour	Brussel
Alternaria spp. (Alternaria)	50	10
Botrytis spp. (Botrytis)	10	45
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1165	1260
<b>Totaal</b>	<b>1225</b>	<b>2420</b>

Het berkenpollenseizoen, dat bekendstaat om zijn sterke allergene potentieel, is momenteel op zijn hoogtepunt. Vorige week werd in Brussel een hoge concentratie gemeten van meer dan 1000 pollen per kubieke meter lucht. Mensen die gevoelig zijn voor pollen van de berkenfamilie worden verzocht extra voorzichtig te zijn, aangezien de komende weken gekenmerkt zullen blijven door een hoog allergierisico.


Daarnaast blijven ook de pollen van andere bomen zoals cipressen, haagbeuken, wilgen en populieren in de lucht aanwezig.

Bovendien is nu het begin van het eikenseizoen aangebroken, waarvan de emissies waarschijnlijk personen zullen raken die gevoelig zijn voor dit type pollen.


## If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae




## Bouleau-Berk-Birch (*Betula*)




## Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



## Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



## Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)



## Charme-Haagbeuk-Hornbeam (*Carpinus*)

