



# AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 20 | 11/05/2026 – 17/05/2026

## Le saviez-vous?

En Belgique, la famille de graminées comprend plus d'une centaine d'espèces différentes. Par conséquent, la saison des pollens de graminées dure très longtemps et les allergènes très similaires de cette famille peuvent causer des réactions croisées. Les personnes allergiques doivent prendre toutes les précautions nécessaires.

## Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



# Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour  
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

11/05-17/05/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Erable)	7	4	5	0	2
Aesculus hippocastanum (Marronnier)	0	0	4	0	0
Alnus spp. (Aulne)	0	1	3	0	3
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	0	0	0	1	0
Apiaceae (Ombellifères)	0	2	0	0	0
Asteraceae (Autres astéracées)	1	0	1	0	1
Betula spp. (Bouleau)	7	16	36	8	23
Carpinus betulus (Charme)	0	0	0	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	0	4	0	0	0
Corylus avellana (Noisetier)	0	0	1	0	0
Fagus sylvatica (Hêtre)	0	3	0	0	8
Hippophae rhamnoides (Argousier)	0	0	0	2	0
Juglans regia (Noyer)	0	5	4	0	3
Ligustrum vulgare (Troène)	0	3	2	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	61	96	473	13	207
Plantago spp. (Plantain)	1	0	7	0	10
Platanus spp. (Platane)	3	2	16	0	1
<b>Poaceae (Graminées)</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
Populus spp. (Peuplier)	0	1	0	0	0
Quercus spp. (Chêne)	2	5	26	5	8
Rumex spp. (Oseille)	6	2	15	0	8
Salix spp. (Saule)	0	2	0	0	0
Sambucus spp. (Sureau)	16	3	14	0	2
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	21	36	16	12	7
Ulmus spp. (Orme)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Urticacées)	5	15	8	0	2
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>215</b>	<b>654</b>	<b>42</b>	<b>310</b>

# Spores fongiques




Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour  
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)


11/05-17/05/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	60	35	45	70
Botrytis spp. (Botrytis)	40	30	35	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	5345	2690	5470	1220
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	0	30	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	10	0	15
<b>Total</b>	<b>5465</b>	<b>3705</b>	<b>5580</b>	<b>1305</b>

La saison pollinique des graminées a officiellement commencé à Bruxelles le 16 mai. Les concentrations étaient encore relativement faibles, mais devraient augmenter dans les prochains jours en raison d'un temps plus favorable. Les personnes sensibles, ainsi que celles fortement exposées localement, en particulier dans le sud-est du pays, doivent continuer à respecter les mesures de précaution.


## Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)



## Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



## Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



## Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)

