



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 27 | 29/06/2026 – 05/07/2026

Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



Graminées

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

29/06-05/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Aesculus hippocastanum (Marronnier)	0	2	0	0	0
Alnus spp. (Aulne)	2	0	0	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	4	7	14	1	3
Apiaceae (Ombellifères)	1	2	0	0	2
Artemisia spp. (Armoise)	0	2	0	0	0
Asteraceae (Autres astéracées)	9	4	2	0	1
Betula spp. (Bouleau)	9	3	1	0	2
Castanea sativa (Châtaignier)	112	190	143	67	117
Cyperaceae (Cypéracées)	0	0	2	0	0
Ericaceae (Ericacées)	0	0	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	0	0	2	0	2
Ligustrum vulgare (Troène)	0	0	0	1	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	0	8	0	6
Plantago spp. (Plantain)	6	3	12	3	1
Poaceae (Graminées)	282	510	556	151	304
Quercus spp. (Chêne)	1	0	0	0	0
Rumex spp. (Oseille)	2	3	8	0	3
Salix spp. (Saule)	0	1	0	0	0
Sambucus spp. (Sureau)	3	1	0	0	4
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	43	46	27	17	14
Tilia spp. (Tilleul)	3	6	11	0	9
Urticaceae (Urticacées)	216	365	375	70	290
Total	695	1145	1162	310	759



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)


29/06-05/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	1630	1410	1465	1070
Botrytis spp. (Botrytis)	135	130	90	35
Cladosporium spp. (Cladosporium)	19160	19525	21595	12555
Epicoccum spp. (Epicoccum)	75	125	155	20
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	5	30	35
Total	21010	24525	23335	13715




La haute saison pollinique des graminées (Poaceae) approche de sa fin. Les concentrations devraient diminuer progressivement au cours des prochaines semaines. Néanmoins, même si les émissions de pollen ont sensiblement diminué, des épisodes de fortes chaleurs peuvent favoriser des phénomènes de resuspension, maintenant ainsi une présence résiduelle dans l'air. Les personnes allergiques aux pollens de graminées sont donc invitées à poursuivre les mesures de précaution jusqu'à la fin effective de la saison, généralement attendue entre fin juillet et début août.

Parallèlement, la période estivale est marquée par des concentrations élevées de spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est dès lors recommandé d'adopter les mesures préventives adaptées afin de limiter leur exposition.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)





Cladosporium



Alternaria

