



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 28 | 06/07/2026 – 12/07/2026

Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



Graminées

Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

06/07-12/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	2	1	3	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	10	10	31	4	4
Apiaceae (Ombellifères)	2	0	1	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	2	3	6	0	4
Asteraceae (Autres astéracées)	0	6	1	0	1
Betula spp. (Bouleau)	4	0	1	1	1
Castanea sativa (Châtaignier)	38	31	81	14	24
Filipendula spp. (Spirée)	2	0	8	0	1
Humulus lupulus (Houblon)	0	1	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	3	12	2	3
Plantago spp. (Plantain)	14	26	15	1	14
Platanus spp. (Platane)	0	1	1	0	0
Poaceae (Graminées)	95	240	216	44	169
Rumex spp. (Oseille)	3	7	14	0	3
Sambucus spp. (Sureau)	0	0	0	0	4
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	18	43	17	11	6
Tilia spp. (Tilleul)	3	5	8	0	4
Urticaceae (Urticacées)	618	535	430	63	280
Total	813	912	845	140	519

Spores fongiques




Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

06/07-12/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	2145	1315	1340	1295
Botrytis spp. (Botrytis)	130	95	140	125
Cladosporium spp. (Cladosporium)	22100	20825	21440	13980
Epicoccum spp. (Epicoccum)	225	235	205	60
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	15	20
Total	24610	26160	23140	15480


La haute saison pollinique des graminées (Poaceae) approche de sa fin. Les concentrations devraient diminuer progressivement au cours des prochaines semaines. Néanmoins, même si les émissions de pollen ont sensiblement diminué, des épisodes de fortes chaleurs peuvent favoriser des phénomènes de resuspension, maintenant ainsi une présence résiduelle dans l'air. Les personnes allergiques aux pollens de graminées sont donc invitées à poursuivre les mesures de précaution jusqu'à la fin effective de la saison, généralement attendue entre fin juillet et début août.

Parallèlement, la période estivale est marquée par des concentrations élevées de spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est dès lors recommandé d'adopter les mesures préventives adaptées afin de limiter leur exposition.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)





Cladosporium



Alternaria

