



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 28 | 06/07/2026 – 12/07/2026

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Grassen

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

06/07-12/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	2	1	0	3	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	10	10	4	31	4
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	2	0	0	1	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	2	3	0	6	4
Asteraceae (Andere composieten)	0	6	0	1	1
Betula spp. (Berk)	4	0	1	1	1
Castanea sativa (Tamme kastanje)	38	31	14	81	24
Filipendula spp. (Spirea)	2	0	0	8	1
Humulus lupulus (Hop)	0	1	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	2	3	2	12	3
Plantago spp. (Weegbree)	14	26	1	15	14
Platanus spp. (Plataan)	0	1	0	1	0
Poaceae (Grassen)	95	240	44	216	169
Rumex spp. (Zuring)	3	7	0	14	3
Sambucus spp. (Vlier)	0	0	0	0	4
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	18	43	11	17	6
Tilia spp. (Linde)	3	5	0	8	4
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	618	535	63	430	280
Totaal	813	912	140	845	519



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)


06/07-12/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	2145	1315	1295	1340
Botrytis spp. (Botrytis)	130	95	125	140
Cladosporium spp. (Cladosporium)	22100	20825	13980	21440
Epicoccum spp. (Epicoccum)	225	235	60	205
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	20	15
Totaal	24610	26160	15480	23140




Het hoogseizoen van de graspollen (Poaceae) loopt stilaan ten einde. De concentraties zullen de komende weken geleidelijk afnemen. Desondanks kunnen perioden met hoge temperaturen, zelfs wanneer de pollenemissies duidelijk zijn verminderd, resuspensieverschijnselen bevorderen, waardoor een resterende hoeveelheid pollen in de lucht aanwezig kan blijven. Personen die allergisch zijn voor graspollen wordt daarom aangeraden de voorzorgsmaatregelen voort te zetten tot het daadwerkelijke einde van het seizoen, dat doorgaans tussen eind juli en begin augustus wordt verwacht.

Tegelijkertijd wordt de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name van de genera *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gesensibiliseerde personen. Het wordt daarom aanbevolen passende preventieve maatregelen te nemen om de blootstelling te beperken.

Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

