



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 29 | 13/07/2026 – 19/07/2026

Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



Graminées

Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

13/07-19/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	1	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	13	12	12	1	6
Apiaceae (Ombellifères)	1	2	3	0	6
Artemisia spp. (Armoise)	4	2	2	0	4
Asteraceae (Autres astéracées)	1	1	6	0	5
Betula spp. (Bouleau)	2	1	2	0	4
Castanea sativa (Châtaignier)	12	11	24	0	20
Filipendula spp. (Spirée)	0	0	0	0	2
Humulus lupulus (Houblon)	0	1	1	0	1
Juncaceae (Juncacées)	0	0	0	1	0
Ligustrum vulgare (Troène)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	7	6	11	0	4
Plantago spp. (Plantain)	15	24	27	2	24
Platanus spp. (Platane)	0	0	1	0	0
Poaceae (Graminées)	122	114	175	5	175
Rumex spp. (Oseille)	11	3	12	0	4
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	11	45	11	3	4
Tilia spp. (Tilleul)	5	3	2	0	3
Urticaceae (Urticacées)	650	745	713	61	663
Total	854	971	1003	73	925

Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

13/07-19/07/2026	Baudour	Bruxelles	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	2330	1260	775
Botrytis spp. (Botrytis)	70	175	80
Cladosporium spp. (Cladosporium)	20735	25720	19095
Epicoccum spp. (Epicoccum)	85	190	75
Stemphylium spp. (Stemphylium)	20	15	30
Total	23240	29710	20055




La saison pollinique des graminées (*Poaceae*) touche pratiquement à sa fin. Les concentrations ont fortement diminué et devraient rester faibles dans les jours à venir, marquant la fin progressive de cette période à risque pour les personnes allergiques.


Les premiers grains de pollen d'armoise (*Artemisia*) ont été détectés dans l'air. Cette dernière vague pollinique allergisante va bientôt débuter et devrait atteindre son pic au cours des prochaines semaines. Les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à anticiper cette évolution et à adapter leurs mesures de prévention en conséquence.

En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)





Cladosporium



Alternaria

