



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 28 | 13/07/2026 – 19/07/2026

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Grassen

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

13/07-19/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	1	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	13	12	1	12	6
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	1	2	0	3	6
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	4	2	0	2	4
Asteraceae (Andere composieten)	1	1	0	6	5
Betula spp. (Berk)	2	1	0	2	4
Castanea sativa (Tamme kastanje)	12	11	0	24	20
Filipendula spp. (Spirea)	0	0	0	0	2
Humulus lupulus (Hop)	0	1	0	1	1
Juncaceae (Russenfamilie)	0	0	1	0	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	7	6	0	11	4
Plantago spp. (Weegbree)	15	24	2	27	24
Platanus spp. (Plataan)	0	0	0	1	0
Poaceae (Grassen)	122	114	5	175	175
Rumex spp. (Zuring)	11	3	0	12	4
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	11	45	3	11	4
Tilia spp. (Linde)	5	3	0	2	3
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	650	745	61	713	663
Totaal	854	971	73	1003	925



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

13/07-19/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan
Alternaria spp. (Alternaria)	2330	1260	775
Botrytis spp. (Botrytis)	70	175	80
Cladosporium spp. (Cladosporium)	20735	25720	19095
Epicoccum spp. (Epicoccum)	85	190	75
Stemphylium spp. (Stemphylium)	20	15	30
Totaal	23240	29710	20055




Het pollenseizoen van grassen (Poaceae) loopt vrijwel ten einde. De concentraties zijn sterk gedaald en zullen naar verwachting de komende dagen laag blijven, wat het geleidelijke einde markeert van deze risicoperiode voor mensen met allergieën.


De eerste pollen van alsem/bijvoet (*Artemisia*) zijn in de lucht waargenomen. Deze laatste allergene pollengolf zal binnenkort beginnen en naar verwachting in de komende weken haar piek bereiken. Personen die gevoelig zijn voor dit type pollen worden aangeraden hierop te anticiperen en hun preventieve maatregelen dienovereenkomstig aan te passen.

Daarnaast blijft de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gevoelige personen. Het wordt daarom aanbevolen om waakzaam te blijven en de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)





Cladosporium



Alternaria

