



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 30 | 20/07/2026 – 26/07/2026

Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



Graminées

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

20/07-26/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1	1	0	0	1
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	10	23	21	0	6
Apiaceae (Ombellifères)	4	0	3	0	4
Artemisia spp. (Armoise)	15	4	7	0	5
Asteraceae (Autres astéracées)	4	3	2	0	5
Betula spp. (Bouleau)	1	1	0	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	5	16	13	6	28
Filipendula spp. (Spirée)	2	0	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	3	3	0	2
Plantago spp. (Plantain)	5	2	6	0	9
Platanus spp. (Platane)	0	0	1	0	0
Poaceae (Graminées)	45	26	41	5	52
Rumex spp. (Oseille)	1	0	5	0	0
Sambucus spp. (Sureau)	0	0	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	5	34	8	0	0
Tilia spp. (Tilleul)	0	2	2	0	0
Urticaceae (Urticacées)	278	325	274	18	409
Total	378	440	386	29	524



Spores fongiques



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)


20/07-26/07/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	455	335	430	385
Botrytis spp. (Botrytis)	20	40	40	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	7425	6045	7620	5780
Epicoccum spp. (Epicoccum)	50	45	55	25
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	5	10	10
Total	7955	8530	8155	6220

La saison pollinique des graminées (*Poaceae*) touche pratiquement à sa fin. Les concentrations ont fortement diminué et devraient rester faibles dans les jours à venir, marquant la fin progressive de cette période à risque pour les personnes allergiques.


Les premiers grains de pollen d'armoise (*Artemisia*) ont été détectés dans l'air. Cette dernière vague pollinique allergisante va bientôt débuter et devrait atteindre son pic au cours des prochaines semaines. Les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à anticiper cette évolution et à adapter leurs mesures de prévention en conséquence.

En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

