



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 30 | 20/07/2026 – 26/07/2026

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Grassen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

20/07-26/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1	1	0	0	1
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	10	23	0	21	6
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	4	0	0	3	4
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	15	4	0	7	5
Asteraceae (Andere composieten)	4	3	0	2	5
Betula spp. (Berk)	1	1	0	0	1
Castanea sativa (Tamme kastanje)	5	16	6	13	28
Filipendula spp. (Spirea)	2	0	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	2	3	0	3	2
Plantago spp. (Weegbree)	5	2	0	6	9
Platanus spp. (Plataan)	0	0	0	1	0
Poaceae (Grassen)	45	26	5	41	52
Rumex spp. (Zuring)	1	0	0	5	0
Sambucus spp. (Vlier)	0	0	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	5	34	0	8	0
Tilia spp. (Linde)	0	2	0	2	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	278	325	18	274	409
Totaal	378	440	29	386	524

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

20/07-26/07/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	455	335	385	430
Botrytis spp. (Botrytis)	20	40	20	40
Cladosporium spp. (Cladosporium)	7425	6045	5780	7620
Epicoccum spp. (Epicoccum)	50	45	25	55
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	5	10	10
Totaal	7955	8530	6220	8155




Het pollenseizoen van grassen (Poaceae) loopt bijna ten einde. De concentraties zijn sterk gedaald en zullen naar verwachting de komende dagen laag blijven, wat het geleidelijke einde markeert van deze risicoperiode voor mensen met allergieën.

De eerste pollen van alsem/bijvoet (*Artemisia*) zijn in de lucht waargenomen. Deze laatste allergene pollengolf zal binnenkort beginnen en naar verwachting in de komende weken haar piek bereiken. Personen die gevoelig zijn voor dit type pollen worden aangeraden hierop te anticiperen en hun preventieve maatregelen dienovereenkomstig aan te passen.


Daarnaast blijft de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gevoelige personen. Het wordt daarom aanbevolen om waakzaam te blijven en de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.




Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

