



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 31 | 27/07/2026 – 02/08/2026

Les pollens allergisants actuellement dans l'air:



Graminées

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

27/07-02/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	0	0	2
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	24	21	21	13	10
Ambrosia spp. (Ambroisie)	0	0	1	0	0
Apiaceae (Ombellifères)	0	4	7	0	3
Artemisia spp. (Armoise)	52	27	23	13	32
Asteraceae (Autres astéracées)	3	4	4	0	0
Betula spp. (Bouleau)	1	0	0	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	5	17	4	0	3
Humulus lupulus (Houblon)	6	0	0	0	4
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	1	2	0	1
Plantago spp. (Plantain)	16	10	37	1	13
Poaceae (Graminées)	18	46	26	13	26
Rumex spp. (Oseille)	2	0	9	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	4	22	5	2	3
Tilia spp. (Tilleul)	0	2	3	0	5
Urticaceae (Urticacées)	952	893	1005	78	781
Total	1085	1047	1147	120	883



Spores fongiques



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

27/07-02/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	1070	1105	1470	1030
Botrytis spp. (Botrytis)	95	100	55	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	38630	43445	42840	20385
Epicoccum spp. (Epicoccum)	105	110	150	55
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	40	30	10
Total	39905	47805	44545	21500




La saison pollinique des graminées (*Poaceae*) touche pratiquement à sa fin. Les concentrations ont fortement diminué et devraient rester faibles dans les jours à venir, marquant la fin progressive de cette période à risque pour les personnes allergiques.


Les concentrations de pollen d'armoise (*Artemisia*) ont augmenté ces derniers jours. Cette dernière vague pollinique a commencé et devrait atteindre son pic au cours des prochaines semaines. Les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à anticiper cette évolution et à adapter leurs mesures de prévention en conséquence.

En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.

Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)




Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

