



# AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 31 | 27/07/2026 – 02/08/2026

**Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:**



Grassen

# Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)

| 27/07-02/08/2026                                        | Baudour | Brussel | De Haan | Genk | Marche-en-Famenne |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------------------|
| Alnus spp. (Els)                                        | 0       | 0       | 0       | 0    | 2                 |
| Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)                       | 24      | 21      | 13      | 21   | 10                |
| Ambrosia spp. (Ambrosia)                                | 0       | 0       | 0       | 1    | 0                 |
| Apiaceae (Schermbloemfamilie)                           | 0       | 4       | 0       | 7    | 3                 |
| Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)                        | 52      | 27      | 13      | 23   | 32                |
| Asteraceae (Andere composieten)                         | 3       | 4       | 0       | 4    | 0                 |
| Betula spp. (Berk)                                      | 1       | 0       | 0       | 0    | 0                 |
| Castanea sativa (Tamme kastanje)                        | 5       | 17      | 0       | 4    | 3                 |
| Humulus lupulus (Hop)                                   | 6       | 0       | 0       | 0    | 4                 |
| Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)                       | 2       | 1       | 0       | 2    | 1                 |
| Plantago spp. (Weegbree)                                | 16      | 10      | 1       | 37   | 13                |
| Poaceae (Grassen)                                       | 18      | 46      | 13      | 26   | 26                |
| Rumex spp. (Zuring)                                     | 2       | 0       | 0       | 9    | 0                 |
| Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie) | 4       | 22      | 2       | 5    | 3                 |
| Tilia spp. (Linde)                                      | 0       | 2       | 0       | 3    | 5                 |
| Urticaceae (Brandnetelfamilie)                          | 952     | 893     | 78      | 1005 | 781               |
| Totaal                                                  | 1085    | 1047    | 120     | 1147 | 883               |



# Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)

| 27/07-02/08/2026                        | Baudour      | Brussel      | De Haan      | Genk         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Alternaria spp. (Alternaria)</b>     | <b>1070</b>  | <b>1105</b>  | <b>1030</b>  | <b>1470</b>  |
| Botrytis spp. (Botrytis)                | 95           | 100          | 20           | 55           |
| <b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b> | <b>38630</b> | <b>43445</b> | <b>20385</b> | <b>42840</b> |
| Epicoccum spp. (Epicoccum)              | 105          | 110          | 55           | 150          |
| Stemphylium spp. (Stemphylium)          | 5            | 40           | 10           | 30           |
| <b>Totaal</b>                           | <b>39905</b> | <b>47805</b> | <b>21500</b> | <b>44545</b> |




Het pollenseizoen van grassen (Poaceae) loopt bijna ten einde. De concentraties zijn bijna nul en zullen naar verwachting de komende dagen laag blijven.


De concentraties van pollen van alsem/bijvoet (*Artemisia*) zijn de afgelopen dagen toegenomen. Deze laatste pollengolf is begonnen en zal naar verwachting in de komende weken haar piek bereiken. Personen die gevoelig zijn voor dit type pollen worden aangeraden hierop te anticiperen en hun preventieve maatregelen tijdig aan te passen.

Daarnaast blijft de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gevoelige personen. Het wordt daarom aanbevolen om waakzaam te blijven en de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)






Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)






Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

