



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 32 | 03/08/2026 – 09/08/2026

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



L'armoise (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

03/08-09/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	3	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	17	29	31	12	14
Apiaceae (Ombellifères)	0	3	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	62	45	47	20	37
Asteraceae (Autres astéracées)	2	2	5	0	1
Betula spp. (Bouleau)	0	0	8	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	1	5	13	3	4
Ericaceae (Ericacées)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirée)	0	1	0	0	2
Humulus lupulus (Houblon)	20	15	20	0	22
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	2	0	1
Plantago spp. (Plantain)	4	9	13	0	5
Poaceae (Graminées)	11	26	24	5	17
Rumex spp. (Oseille)	0	1	3	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	3	9	8	3	4
Tilia spp. (Tilleul)	0	2	4	0	1
Urticaceae (Urticacées)	704	911	950	91	438
Total	824	1058	1131	134	547



Spores fongiques



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)


03/08-09/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	920	1060	2165	1020
Botrytis spp. (Botrytis)	115	115	20	150
Cladosporium spp. (Cladosporium)	41490	41825	38515	26480
Epicoccum spp. (Epicoccum)	145	170	190	140
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	30	40	15
Total	42680	46035	40930	27805

La saison pollinique des graminées (*Poaceae*) est maintenant terminée. Les concentrations de pollen sont pratiquement nulles et ne devraient plus connaître d'augmentation significative, mettant fin à cette longue période à risque pour les personnes allergiques.


Les concentrations en pollen d'armoise (*Artemisia*) ont augmenté la semaine dernière. Cette dernière vague pollinique a vraisemblablement atteint son pic. Les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à maintenir toutes les mesures de précaution.

En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.

Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

