



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 32 | 03/08/2026 – 09/08/2026

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



De alsem of bijvoet (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

03/08-09/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	3	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	17	29	12	31	14
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	3	0	0	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	62	45	20	47	37
Asteraceae (Andere composieten)	2	2	0	5	1
Betula spp. (Berk)	0	0	0	8	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	1	5	3	13	4
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirea)	0	1	0	0	2
Humulus lupulus (Hop)	20	15	0	20	22
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	0	2	1
Plantago spp. (Weegbree)	4	9	0	13	5
Poaceae (Grassen)	11	26	5	24	17
Rumex spp. (Zuring)	0	1	0	3	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	3	9	3	8	4
Tilia spp. (Linde)	0	2	0	4	1
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	704	911	91	950	438
Totaal	824	1058	134	1131	547

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

03/08-09/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	920	1060	1020	2165
Botrytis spp. (Botrytis)	115	115	150	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	41490	41825	26480	38515
Epicoccum spp. (Epicoccum)	145	170	140	190
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	30	15	40
Totaal	42680	46035	27805	40930




Het graspollenseizoen (Poaceae) is nu afgelopen. De pollenconcentraties zijn nagenoeg nul en zullen naar verwachting niet meer noemenswaardig toenemen. Daarmee komt er een einde aan deze lange risicoperiode voor mensen met een pollenallergie.


De concentraties bijvoetpollen (*Artemisia*) zijn vorige week toegenomen. Deze laatste pollenpiek heeft vermoedelijk haar hoogtepunt bereikt. Personen die gevoelig zijn voor dit type pollen wordt aangeraden alle voorzorgsmaatregelen te blijven naleven.

Daarnaast blijft de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gevoelige personen. Het wordt daarom aanbevolen om waakzaam te blijven en de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.


Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)




Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

