



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 33 | 10/08/2026 – 16/08/2026

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



L'armoise (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

10/08-16/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	2	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	26	24	28	6	22
Ambrosia spp. (Ambroisie)	0	0	1	0	0
Apiaceae (Ombellifères)	0	0	0	0	2
Artemisia spp. (Armoise)	54	31	35	2	27
Asteraceae (Autres astéracées)	4	2	7	0	7
Betula spp. (Bouleau)	4	1	3	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	8	1	13	0	1
Filipendula spp. (Spirée)	1	0	0	0	14
Humulus lupulus (Houblon)	82	191	32	0	32
Juncaceae (Juncacées)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	6	0	0
Plantago spp. (Plantain)	11	11	10	0	11
Poaceae (Graminées)	18	23	23	3	38
Rumex spp. (Oseille)	2	3	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	3	19	1	0	1
Tilia spp. (Tilleul)	0	0	6	0	0
Urticaceae (Urticacées)	1447	1048	921	92	811
Total	1661	1354	1089	103	966



Spores fongiques




Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

10/08-16/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	605	635	900	800
Botrytis spp. (Botrytis)	55	95	70	60
Cladosporium spp. (Cladosporium)	16500	16025	23015	10805
Epicoccum spp. (Epicoccum)	90	100	325	55
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	10	5
Total	17255	19250	24320	11725


Les concentrations en pollen d'armoise (*Artemisia*) ont diminué la semaine dernière. Toutefois, les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à maintenir toutes les mesures de précaution jusqu'à la fin de la saison.

En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.

Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)




Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

