




AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 35-40 | 24/08/2026 – 30/09/2026

Avec la fin officielle de la saison pollinique, cette newsletter hebdomadaire est la dernière de l'année 2026. Un feuillet résumant l'année complète sera également publié à la fin de l'année. Les résultats des concentrations de spores de moisissures resteront disponibles sur le site web <https://airallergy.sciensano.be/fr>,

Les spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



***Cladosporium* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

28/09-30/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	3	1	0	0	2
Ambrosia spp. (Ambroisie)	4	1	4	0	3
Artemisia spp. (Armoise)	1	1	1	2	5
Betula spp. (Bouleau)	1	0	0	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	0	4	0	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	0	6	2	0	1
Ligustrum vulgare (Troène)	0	3	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	91	26	0	4
Plantago spp. (Plantain)	1	0	8	3	1
Poaceae (Graminées)	0	1	0	0	2
Rumex spp. (Oseille)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	0	0	0	0	1
Urticaceae (Urticacées)	16	9	7	6	2
Total	26	118	48	11	21



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

21/09-27/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	0	0	1
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	2	5	1	0	2
Ambrosia spp. (Ambroisie)	1	0	0	0	2
Artemisia spp. (Armoise)	0	0	0	0	1
Betula spp. (Bouleau)	0	1	0	0	18
Castanea sativa (Châtaignier)	2	4	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	12	1	4	0	4
Humulus lupulus (Houblon)	0	0	1	0	0
Juglans regia (Noyer)	0	0	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	69	147	14	0	12
Plantago spp. (Plantain)	0	4	9	0	1
Poaceae (Graminées)	8	4	3	0	6
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	1	2	1	0	1
Urticaceae (Urticacées)	43	43	31	4	15
Total	138	211	65	4	64



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

14/09-20/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1	0	0	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	1	0	1	0	1
Ambrosia spp. (Ambroisie)	0	0	3	0	1
Apiaceae (Ombellifères)	0	2	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	0	0	0	1	0
Betula spp. (Bouleau)	5	0	0	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	3	1	6	0	2
Filipendula spp. (Spirée)	15	9	6	0	4
Humulus lupulus (Houblon)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	9	10	2	0	10
Plantago spp. (Plantain)	5	4	15	0	4
Poaceae (Graminées)	5	9	4	4	11
Rumex spp. (Oseille)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	0	0	1	0	0
Tilia spp. (Tilleul)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Urticacées)	95	111	91	1	57
Total	140	147	130	6	90



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

07/09-13/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	4	3	7	1	0
Ambrosia spp. (Ambroisie)	0	3	4	1	2
Artemisia spp. (Armoise)	2	0	1	0	0
Asteraceae (Autres astéracées)	0	2	1	0	0
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	1	0	4	0	2
Ericaceae (Ericacées)	0	0	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	9	5	4	7	14
Humulus lupulus (Houblon)	0	2	8	0	1
Ligustrum vulgare (Troène)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	1	1	2
Plantago spp. (Plantain)	3	4	7	2	9
Poaceae (Graminées)	20	10	20	36	5
Rumex spp. (Oseille)	0	1	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	0	2	0	1	1
Tilia spp. (Tilleul)	1	0	1	0	0
Urticaceae (Urticacées)	163	170	140	45	67
Total	203	202	200	95	104



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

31/08-06/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	0	1	0	0
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	13	5	9	2	5
Ambrosia spp. (Ambroisie)	1	1	10	0	1
Artemisia spp. (Armoise)	1	1	0	1	0
Asteraceae (Autres astéracées)	1	1	2	0	2
Betula spp. (Bouleau)	2	0	0	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	0	0	1	0	2
Filipendula spp. (Spirée)	19	5	13	5	8
Humulus lupulus (Houblon)	1	2	4	0	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	5	0	1
Plantago spp. (Plantain)	5	1	18	0	1
Poaceae (Graminées)	21	16	12	23	2
Rumex spp. (Oseille)	0	0	3	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	3	1	0	0	1
Tilia spp. (Tilleul)	0	0	1	0	0
Urticaceae (Urticacées)	297	267	238	79	133
Total	364	301	317	110	159



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

24/08-30/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	1	0	0	1
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	13	10	9	16	3
Ambrosia spp. (Ambroisie)	2	0	6	0	0
Apiaceae (Ombellifères)	1	0	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	4	4	4	3	0
Asteraceae (Autres astéracées)	1	0	1	0	0
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	1	0
Castanea sativa (Châtaignier)	2	5	6	0	4
Ericaceae (Ericacées)	0	0	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	9	0	0	0	2
Hippophae rhamnoides (Argousier)	0	0	1	0	0
Humulus lupulus (Houblon)	4	18	5	5	1
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	5	0	2
Plantago spp. (Plantain)	1	1	7	1	3
Poaceae (Graminées)	5	4	2	10	3
Quercus spp. (Chêne)	0	0	0	1	0
Rumex spp. (Oseille)	0	0	0	1	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	5	10	1	1	0
Tilia spp. (Tilleul)	0	1	0	0	0
Urticaceae (Urticacées)	330	249	171	205	54
Total	378	303	219	244	73



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

28/09-30/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	200	235	215
Botrytis spp. (Botrytis)	70	45	30
Cladosporium spp. (Cladosporium)	11470	10360	9970
Epicoccum spp. (Epicoccum)	55	100	130
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	10
Total	11800	19990	10355

21/09-27/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	430	410	550	465
Botrytis spp. (Botrytis)	120	145	75	25
Cladosporium spp. (Cladosporium)	17415	23325	16460	10715
Epicoccum spp. (Epicoccum)	105	145	400	135
Stemphylium spp. (Stemphylium)	40	40	25	50
Total	18110	45025	17510	11390

14/09-20/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	550	945	1040	550
Botrytis spp. (Botrytis)	330	410	685	90
Cladosporium spp. (Cladosporium)	35695	49785	63220	14740
Epicoccum spp. (Epicoccum)	95	205	315	25
Stemphylium spp. (Stemphylium)	30	20	45	140
Total	36700	59545	65305	15545



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

07/09-13/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	570	630	665	755
Botrytis spp. (Botrytis)	230	200	400	70
Cladosporium spp. (Cladosporium)	36730	36120	43755	26475
Epicoccum spp. (Epicoccum)	70	135	215	95
Stemphylium spp. (Stemphylium)	20	20	10	135
Total	37620	45045	45045	27530


31/08-06/09/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	725	610	715	590
Botrytis spp. (Botrytis)	485	320	380	90
Cladosporium spp. (Cladosporium)	51885	54370	72165	29950
Epicoccum spp. (Epicoccum)	240	210	355	165
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	40	20
Total	53345	64290	73655	30815

24/08-30/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	935	960	700	850
Botrytis spp. (Botrytis)	370	360	350	265
Cladosporium spp. (Cladosporium)	81100	81175	72160	76390
Epicoccum spp. (Epicoccum)	475	200	380	125
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	55	35	145
Total	82890	86970	73625	77775



Les personnes fortement sensibilisées aux spores fongiques du genre *Cladosporium* pourraient encore ressentir des symptômes. Bien que le pic soit passé, les concentrations sont encore relativement élevées et fluctuantes dans toutes les stations de surveillance du réseau.

Cladosporium



Alternaria

